ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ QUỲNH AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 608/UBND-KT V/v Thông báo sâu bệnh hại cuối vụ Mùa và biện pháp phòng trừ	*Quỳnh An, ngày 11 tháng 9 năm 2026*

Kính gửi:

- Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp;
- Thủ trưởng các ngành, phòng có liên quan;
- Các cơ sở thôn trên địa bàn xã.

Đến thời điểm ngày 10/9 các diện tích lúa đã trỗ xong tương đối an toàn về sâu bệnh, tuy nhiên một số diện tích trỗ bông từ ngày 23-25/8 tỉ lệ đen lép hạt cá biệt 10 - 20% số hạt; diện tích lúa có mật độ sâu đục thân 2 chấm cao, do thời điểm phòng trừ gặp mưa, phòng trừ không đúng liều lượng, nồng độ, không đúng chủng loại thuốc tỉ lệ dảnh héo, bông bạc 3-5%, cá biệt 10-15% số dảnh. Số diện tích lúa trỗ bông sau ngày 10/9 có nguy cơ rất cao mất mùa do sâu bệnh nếu không được phòng trừ kịp thời. Theo điều tra của trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Quỳnh Phụ ở những diện tích này có mật độ sâu cuốn lá và sâu đục thân 2 chấm rất cao do dồn mật độ, mật độ ổ trứng sâu đục thân trung bình 0,05-0,1 ổ/m^2, nơi cao 0,3-0,5 ổ/m^2, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây tỷ lệ bông bạc trên 5% thậm trí 10-20% số bông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cuối vụ.

* Bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại nặng, làm thiệt hại lớn đến năng suất lúa mùa trên các giống nhiễm như BC15, TBR225, Q5, Nếp địa phương... khi lúa trỗ bông gặp mưa, không khí lạnh, đêm nhiều sương…

Để làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2026, Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo cáo một số biện pháp phòng trừ sau:

1. **Đối với sâu đục thân 2 chấm:** Thời gian phòng trừ từ ngày 14-16/9/2026 cho toàn bộ diện tích trỗ bông sau ngày 10/9.

Thuốc phòng trừ: Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 200SC; Prevathon 200SC; Voliam targo 063SC; Chlorferan 240SC; …để phun trừ.

2. Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích cấy các giống nhiễm như BC15, TBR225, Q5, Nếp địa phương... khi lúa trỗ bông gặp mưa, không khí lạnh, đêm nhiều sương nhất thiết phải phun phòng bệnh đạo ôn 2 lần: Lần 1 khi lúa thấp thô trỗ, lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn. Khuyến cáo nông dân sử dụng một trong các loại thuốc sau như: Beam 75WP; Katana 20SC; Kasoto 200SC; Filia 525SE; Bankan 600WP; Feliso 360EC; Blastogan 75WP; Angate 75WP;... để phòng trừ.

3. Rầy các loại: khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên phát hiện ổ rầy 1000 con/m^2 trở lên cần kết hợp phòng trừ. Thuốc phòng trừ: Chess 50WG; Pexena 20WG; Titan 600 WG; TT Led 70WG; Oshin 20WP; Midan10WP... để phòng trừ.

4. Đối với bệnh khô vằn:

Cần phun phòng trừ khi tỷ lệ bệnh từ 5% số dảnh trở lên bằng một trong các loại thuốc: Anvil 5SC; Amistar top 325SC; Nevo 330EC…

5. Bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn:

Các giống lúa có nguy cơ nhiễm bệnh cao, sau các đợt mưa giông khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc như: Visen 20SC; Xanthomix 20WP; Staner 20WP; Totan 200WP;… để phun phòng.

Lưu ý:

- Các loại thuốc phòng trừ dịch hại, phải sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam còn hạn sử dụng và sản phẩm uy tín, nhận diện trên thị trường, phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

- Vỏ chai, bao bì đựng thuốc sâu sau khi phòng trừ phải được thu gom để đúng nơi quy định tránh gây ô nhiễm môi trường.

Nhận thông báo, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc HTX DV Nông nghiệp; Các cơ sở thôn tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân biết và có biện pháp phòng trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Như trên;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ QUỲNH AN T.HƯNG YÊN

Nguyễn Duy Đằng